




PROGRAM ve ÖZETLER

PROGRAM and ABSTRACTS



XV. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ

“ULUSLARARASI KATILIMLI”

**ANKARA ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ BÖLÜMÜ**

5-9 Eylül 2000 ANKARA – TÜRKİYE

XVth NATIONAL CONGRESS ON BIOLOGY

“WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION”

**ANKARA UNIVERSITY, FACULTY OF SCIENCE
DEPARTMENT OF BIOLOGY**

SEPTEMBER 5-9, 2000 ANKARA- TURKEY

edilen biyokimyasal veriler doğrultusunda rektumun fizyolojik ve davranış biyolojileri açısından bu böceklerdeki rolü açıklanmaya çalışılmıştır.

11:30 İPEK BÖCEĞİ (*Bombyx mori*)'NDE BEYNİN OVARYUM GELİŞİMİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN TRANSPLANTASYON VE KOTERİZASYON YÖNTEMLERİ İLE ARAŞTIRILMASI, Osman PARLAK, N. Ebru KURTULUŞ, Ege Üniv Fen Fak Biyoloji Böl Zooloji ABD 35100 İZMİR

İpekböceği (*Bombyx mori*), böceklerde gelişimin hormonal kontrolünü ortaya koymak için oldukça fazla çalışılan bir materyaldir. Bu çalışmada transplantasyon ve koterizasyon yöntemleri kullanılarak: *Bombyx mori*'de beynin ovaryum gelişimi üzerine olan etkisi araştırılmıştır. Ayrıca Lowry metoduyla ovaryumlardaki total protein miktarları tespit edilmiştir. Denemelerin sonucunda beynin ovaryum gelişimi üzerine etkisi olduğu gözlenmiştir. Bu etkide PTH ve Bombyxin anahtar hormonlar olarak görülmektedir. Koterizasyon ve transplantasyon uygulanan hayvanlar ovaryum foliküllerinin gelişimi ve ovaryumlardaki total protein miktarları bakımından kontrol hayvanlarıyla karşılaştırılmıştır.

12:00 ANTAKYA-GAZİANTEP BÖLGESİ (Amanos Dağları) HERPETOFAUNASI, Rıdvan KETE, İrfan YILMAZ, S. Hakan DURMUŞ, Adem ÖZDEMİR, Dokuz Eylül Üniv Buca Eğt Fak Biyoloji Eğt Böl ABD Buca İZMİR

Ülkemizin zoocoğrafik konumu ve farklı iklim özellikleri, sahip olduğumuz faunanın zenginliği ve çeşitliliğinin en önemli sebebidir. Zoocoğrafik bakımdan yakın komşumuz olan Kafkasya, Arabistan ve Balkanlar yoluyla farklı zoocoğrafik bölgelere ait türler yurdumuza girmiş ve belli bölgelerdeki izolasyona bağlı olarak çeşitli alttürler meydana getirmiştir. Bu açıdan enteresan bir bölge olan Amanos dağları; Akdeniz Bölgesi ile Suriye ve Arabistan arasında izolasyonu sağlar. Türkiye herpetofaunasına ait çeşitli araştırmalarda bu bölgenin zoocoğrafik bakımdan önemi vurgulanmıştır. Yeni alttürlerin bulunabilme ihtimalini göz önüne alarak Antakya-Gaziantep bölgesi dahilinde bulunan Amanos dağlarının amfibi ve sürüngen faunasını ortaya çıkarmak üzere 1998-1999 yıllarında bölgeye ekskürsiyonlar düzenleyerek oldukça bol miktarda materyal toplanmıştır. Araştırmamız çerçevesinde toplanan 5 amfibi, 3 kaplumbağa, 16 kertenkele ve 9 yılan türü morfolojik olarak incelenmiştir. Mevcut türlere ait bilinen özellikler ile materyalimize ait renk-desen durumu ve morfometrik ölçümler karşılaştırılarak farklılıklar belirtilmiştir. Ayrıca tespit edilen türlerin biyolojik ve ekolojik özelliklerine ait dikkati çeken hususlarda kayıt edilmiştir. Elde edilen bulgularımız mevcut materyal ışığında değerlendirildiğinde bazı türlerin subspeciesif durumlarının yeniden ele alınması gerektiği anlaşılmaktadır.

12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ

13:30 BEYŞEHİR GÖLÜ'NDEKİ ADALARIN HERPETOFAUNASI, Mehmet ÖZ, Serdar DÜŞEN, M. Rıdvan TUNÇ, Akdeniz Üniv Fen-Edb Fak Biyoloji Böl ANTALYA

Bu çalışmada, şimdiye kadar hiç araştırılmamış olan Beyşehir Gölü'ndeki adalarda yaşayan Amfibi ve Sürüngen türlerinin tespiti amaçlanmıştır. Bu nedenle 28 Mayıs 1999 tarihinden sonra Beyşehir Gölü'ndeki yaklaşık 25 adanın 17'sine gidilerek materyal toplanmış ve gözlemler yapılmıştır. Yapılan ilk tespitlere göre örneklerimiz 10 familyaya ait 14 türden oluşmaktadır. Bu türlerden 3'ü kurbağa, 2'si kaplumbağa, 5'i kertenkele ve 4'ü yılanlara aittir. Tespit edebildiğimiz türlerin tamamı araştırma bölgemiz için yeni kayıttır.

14:00 ADANA EVCİL KEÇİLERİNDE (*Capra hircus*) Polyplastron (CILIOPHORA: ENTODINIOMORPHIDA: OPHRYOSCOLECIDAE) CİNSİNİN BULUNUŞU VE TAKSONOMİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, Bayram GÖÇMEN, Mustafa İNANÇ, Samiye RASTGELDI, Murat TOSUNOĞLU, Ege Üniv Fen Fak Biyoloji Böl Zooloji ABD 35100 Bornova İZMİR

Adana civarında yaşayan evcil keçilerin işkembe içeriği *Polyplastron* cinsine dahil siliyatlar açısından araştırılmıştır. Evcil Adana keçilerinde bu cinsin tek tür, *Polyplastron multivesiculatum* ile temsil edildiği saptanmıştır.

14:30 TÜRKİYE'DEKİ *Microtus epiroticus* (ONDRIAS, 1966) (MAMMALIA: RODENTIA)'UN ÜREME BİYOLOJİSİ VE DOĞUM SONRASI GELİŞİMİ ÜZERİNE GÖZLEMLER, Tolga KANKILIC, Nuri YİĞİT,

Ercüment ÇOLAK, Ankara Üniv Fen Fak Biyoloji Böl 06100 ANKARA

Bu çalışmada, *Microtus epiroticus*'un üreme biyolojisi ve doğum sonrası gelişimi arazi ve laboratuvar çalışmalarıyla incelendi. Arazi çalışmalarında Ocak-Eylül ayları arasında doğum yapan veya üreme belirtisine sahip örnekler yakalandı. Laboratuvarında ise *M. epiroticus*'un Aralık ayından Ekim ayına kadar doğum yaptığı belirlendi. Hamilelik süresinin 20-21 gün arasında değiştiği, yavru sayısı 2 ile 8 arasında olduğu, ortalama yavru sayısının 4,56 olduğu saptandı. Yavruların ortalama 2,29 gr. ağırlığında doğduğu ve kürk gelişiminin 7-9 günde tamamlandığı belirlendi. Gözler 9-12 günde, kulaklar 10-13 günde açıldı. Yavrular 12-15 günde serbest beslenmeye başladı ve 13-17 günde süttten kesildi. Doğum sonrası gelişimde büyüme oranının en yüksek değeri 18. gün ile 24. gün arasında gerçekleşti. Üreme erginliğine dişiler en erken 35 günde, erkekler 42 günde ulaştı. Yavrular ergin örneklerin ağırlık ve diş karekter ölçülerine 37-60 günde ulaştılar.

15:00 KUZAY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EVCİL KOYUNLARININ (*Ovis ammon aries*) OPHRYOSCOLECID (ENTODINIOMORPHIDA) İŞKEMBE SİLİYAT FAUNASI, Bayram GÖÇMEN¹, Burk A. DEHORITY², Samiye RASTGELDI¹, Gül H. TALU¹, ¹Ege University, Faculty Of Science Department of Biology Zoology Section Protozoology-Parasitology Research Laboratory, 35100 Bornova-İZMİR, ²Department of Animal Science Ohio Agricultural Research and Development Center The Ohio State Univ Wooster Ohio 44691 U.S.A.

Kıbrıs evcil koyun (*Ovis ammon aries*)'larının işkembesinde yaşayan Ophryoscolecidae familyasına dahil siliyat protozoon içeriği araştırılmıştır. Araştırma sonucunda 5 cins [*Metadinium*, *Enoploplastron*, *Polyplastron*, *Epidinium* ve *Ophryoscolex*] altında 6 tür [*Metadinium affine*, *Enoploplastron tricoloratum*, *Polyplastron multivesiculatum*, *Epidinium ecaudatum*, *Epidinium graini* ve *Ophryoscolex purkynjei*] ve 14 forma [*E. e. f. ecaudatum*, *E. e. f. caudatum*, *E. e. f. bicaudatum*, *E. e. f. tricaudatum*, *E. e. f. quadricaudatum*, *E. g. f. graini*, *E. g. f. caudatricoronatum*, *E. g. f. caudaquadricoronatum*, *O. p. f. purkynjei*, *O. p. f. bifidobincinctus*, *O. p. f. bifidoquadricinctus*, *O. p. f. bicoronatus*, *O. p. f. tricornatus* ve *O. p. f. quadricoronatus*] tayin edilmiştir. Ayrıca bu çalışma *Epidinium graini* ve *Ophryoscolex purkynjei* f.

bifidobiacinctus için koyunların iřkembesinde bulunduđuna iliřkin ilk kayıttır. alıřmada belirlenmiř olan cins. tr ve formlara ait incelenen rneklerde tesbit edilen taksonomik karakterler, orijinal tanım ve literatrde mevcut tanımlarla karřılařtırılarak benzerlik ve farklılıklar tartıřılmıřtır. Kıbrıs koyunlarında bulunan Ophryoscolecidae familyasına dahil iřkembe siliyat faunasının, ierdiği tr eřitliliđi aısından Trkiye ve Uzak Dođu (in/Japonya) lkelerinkine gre daha fakir, buna karřın Batı Avrupa (İřkoya) ile Amerika (Alaska/Kanada)'daki koyun faunalarına gre daha zengin olduđu saptanmıřtır.

15:30 ARA

16:00 **Culex pipiens (CULICIDAE) LARVA VE ERGİNİNİN POSTERİOR ORTA BARSAK DUVARI İNCE YAPISININ İŐİK VE ELEKTRON MİKROSKOBU İLE GSTERİLMESİ**, Nazan KESKİN¹, Sabire KARAALI² ¹ Pamukkale niv Fen-Edb Fak Biyoloji Bl DENİZLİ, ² Ege niv Fen Fak Biyoloji Bl 35100 Bornova İZMİR

Sivrisinekler aracılıđıyla bulařan sıtma hastalığında, *Plasmodium*'ların yařam emberlerinin bir dnemi sivrisineklerin orta barsak duvarında geer. *Plasmodium*'lar, posterior orta barsak bazal tabakasına yerleřtikten 10 gn sonra vcut bořluđuna dklrlir. Sivrisinek trlerinde, orta barsak epitel hcreleri yapısal olarak benzerlik gsterir. Bu alıřmada: *Culex pipiens*'in larva ve erginlerinin posterior orta barsak duvarı yapısı, ışık ve elektron mikroskobu dzeyinde gsterilmiřtir. *Culex pipiens* larva ve erginlerinin, posterior orta barsak duvarı yapısal olarak benzerlik gstermektedir. Iřık ve elektron mikroskobu ile yapılan incelemelerde, orta barsak duvarının dıřtan kaslarla desteklenmiř, mikrovilluslu tek tabakalı epitel hcrelerden meydana geldiđi grlmřtr. Larval barsak duvar hcreleri ergine gre daha iridir. Bununla birlikte, erginde kas demetleri larvadakine gre daha kalındır. *Culex pipiens* larva ve erginlerinde, posterior orta barsak duvarında koyu ve aık renkte olmak zere iki farklı tip epitel hcresi ayırt edilir. Elektron mikroskobu ile yapılan incelemelerde, bu hcreler zellikle bazal tabakayla yzleřen kanalikl sistemleri, endoplazmik retikulum zarları, mitokondriyumları ve elektronca az yođun keseleri bakımından farklı bulunmuřlardır. Bu morfolojik farklılıklar, *Plasmodium*'ların belli hcreleri seerek tutunması ve duvarı gemesinde nemli olabilir.

16:30 **LARVAL EVREDEKİ Galleria mellonella (LEPIDOPTERA)'NİN SİALİKASİDİ UZAKLAŐTIRILMIŐ PROTORASİK BEZLERİNE HEMOSİTLERİN TUTUNMASI**, Sabire KARAALI, Remziye DEVECİ, Sacide PEHLIVAN, Ali ZCAN, Ege niv Fen Fak Biyoloji Bl Molekler Biyoloji ABD 35100 Bornova İZMİR

nceki alıřma *Galleria mellonella*'nın protorasik bezinde Sialik asidin (SA) varlıđını gstermiřtir (KARAALI et al., 1997). Bu alıřmada protorasik bezlerin dejenerasyon srecinde sialik asidin roln arařtırdık. Nraminidaz uygulanan larval protorasik bezler aynı yařtaki larvadan alınan hemolenf ile inkbe edildi. Iřık ve elektron mikroskobu gzlemleri sialik asidi uzaklařtırmıř bez hcrelerinin etrafında hemositlerin birikimi ile tamamlanmamıř bir kapsl Őekillendiđini gstermiř fakat kontrol grubunda grlmemiřtir. Sialik asidi uzaklařtırılmıř larval protorasik bez hcreleri hemositler tarafından yabancı bir yapı ya da kendinden olmayan olarak tanınmıřtır. Sonu iřaret ediyor ki, sialik asit larval dnemde normal Őartlarda hemositik reseptr iin bir maske rol oynamaktadır. Her nasılsa sialik asidin yokluđunda bezlerin dejenerasyonu bařlar. Bu yayının esas katkısı iki yndedir. Birincisi, pupal hcrelerde protorasik bezin dejenerasyonunu bařlatan hemositlerin tanıma srecinde sialik asidin rol iin bir aıklama sađladıđ. İkinci olarak sonularımız, Sialik asidin evrensel bir molekl olduđunu dođrulayarak bceklerde sialik asidin grevini gsterir.

17:00 **SNE (Eurygaster) TRLERİNDE GŐ UUŐU VE REME ETKİNLİKLERİ SRECİNDE UMA KASLARINDA VE YUMURTALIKLARDA YAPISAL DEĐİŐİM**, Benan GLAY, zlem İSTANBULLU, Sema ERGEZEN, Marmara niv Atatrk Eđt Fak Biyoloji Eđt ABD İSTANBUL

alıřma, Sne'de sırası ile oluřan ve birbirine zıt alıřan gŐ uuŐu ve reme faaliyetleri sırasında kaslarda ve yumurtalıklarda birbirlerinin lehine olabilecek morfolojik deđiřimleri gstermeyi amalamaktadır. Dođadan, kışlama, gŐ uuŐu ve yumurtlama srelerinde toplanan bceklerle laboratuvarında yapay iklim kořulları ve beslenme rejimleri uygulanmıř, bylece uma iřleminin durdurulması, zamansız bařlatılması, remenin hızlandırılması ve durdurulması sađlanmıřtır. Deđiřik fizyolojik durumlarda uma kasları ve yumurtalıklar histolojik olarak hazırlanmıř ve morfometrik alıřma yapılmıřtır. Sonularda gŐ uuŐu yapan bekte uma kası lif apının uma faaliyeti durdurulan ve yumurtlayan bireylerin kas liflerine oranla daha byk olduđu, yumurtalıkların geliřmediđi gzlenmiřtir. Yumurtlama srecindeki bceklerde ise lif aplarının kcldđ saptanmıřtır. lm deđerlerinin istatistiksel analizi, farklılıkların anlamlı olduđunu gstermiřtir. Kaslardaki deđiřimin yumurtlama srecinde bir histoliz veya benzeri faaliyet olup olmadıđı olasılıđı zerinde durulmuřtur.

17:30 **Rana ridibunda (AMPHIBIA: ANURA) VE Oryctolagus cuniculus (MAMMALIA: LAGOMORPHA) TRLERİNİN UZUN KEMİK HİSTOMORFOLOJİSİ ZERİNE GZLEMLER**, Uđur C. ERİŐMİŐ¹, Hseyin ARIKAN², Uđur KAYA², ¹Ege niv Fen Fak Biyoloji Bl Zooloji ABD 35100 Bornova İZMİR, ²Kocatepe niv Fen-Edb Fak Biyoloji Bl 03100 AFYON

Rana ridibunda ve *Oryctolagus cuniculus*'da uzun kemiklerin histomorfolojik yapısı dekalsifikasyon yntemi kullanılarak incelenmiř ve karřılařtırılmıřtır. Omurgalı hayvanlarda, kemiđin ince yapısı hayvanların yařlarının tespitinde uzun sredir kullanılmaktadır. Bununla birlikte, yař kriterlerine ait izler eřitli gruplarda farklılık gstermektedir. *Rana ridibunda*'da yařa bađımlı byme halkaları bariz Őekilde gzlenmiř ve szkonusu tekniđin bu tre uygun ve uygulanabilir olduđu anlařılmıřtır. Fakat bu izgiler *Oryctolagus cuniculus*'da gzlenmemiřtir.